4 kg

挿管 / 麻酔導入

硫酸アトロピン (0.5 mg/1 mL) 原液	0.2 mL
ドルミカム (10 mg/2 mL)	2 mL + 生食 8 mL (計 10 mL) 0.4 mL
フェンタニル (100 µg/2 mL) 原液	0.2 mL
エスラックス (25 mg/2.5 mL) 原液	0.4 mL
挿管チューブ (サイズ) (固定長)	ID 3.0 mm カフなし 経口 10 cm / 経鼻 12 cm
喉頭鏡ブレード	Mil 0 or 1 / (Mac 0)
骨髄針	15 G
中心静脈カテーテル	4 Fr トリプル
膀胱カテーテル	6 Fr
胃管	8 Fr 25 cm 固定
胸腔ドレーン	12 Fr

輸液

維持量	16 mL/ 時
急速投与	1 回 80 mL 投与後再評価
輸血	1 回 40 mL 投与後再評価

4 kg

CPR/ 不整脈

胸骨圧迫：人工呼吸	15：2	除細動	16 J
Cardioversion（同期）	1 回目	4 J	
	2 回目以降	8 J	
アドレナリン（1 mg/1 mL）	1 mL + 生食 9 mL（計 10 mL） 0.4 mL （気管内：原液 0.4 mL）		
硫酸マグネシウム （2.46 g/20 mL）	原液	1.6 mL	20 分以上かけて投与
アデホス L コーワ （10 mg/2 mL）	2 mL + 生食 8 mL（計 10 mL）		
	1 回目	0.4 mL	
	2 回目以降	0.8 mL	
硫酸アトロピン（0.5 mg/1 mL）	原液 0.2 mL		
アンカロン（150 mg/3 mL）	3 mL + 5% ブドウ糖 57 mL （計 60 mL）		
VF / 脈なし VT	4 mL		
脈あり VT	4 mL	15 分で投与	（16 mL/ 時）

けいれん

ドルミカム（10 mg/2 mL）	2 mL + 生食 8 mL（計 10 mL） 0.4 mL （筋注 / 鼻腔内：原液 0.1 mL）		
ラボナール（300 mg/12 mL）	原液	0.3 mL	
ノーベルバル（250 mg/ 瓶）	1 瓶 を生食 5 mL で希釈 希釈液 1.6 mL + 生食 18.4 mL （計 20 mL） 20 分で投与 （60 mL/ 時）		
ホストイン（750 mg/10 mL）	1.2 mL + 生食 18.8 mL（計 20 mL） 20 分で投与 （60 mL/ 時）		
ダイアップ坐（4 mg）	0.5 個		

4 kg

電解質異常・低血糖

メイロン注 (8.4%)	原液	4 mL
カルチコール (8.5%)	原液	2 mL
20% ブドウ糖	原液	20 mL
10%塩化ナトリウム	原液 8 mL + 5%ブドウ糖 16 mL (計 24 mL)	30分で投与 (48 mL/時)
ケイキサレート (5 g/包) 1包 + 5%ブドウ糖	20 mL	8 mL (注腸)
GI療法 ヒューマリン R100	0.2 mL+10%ブドウ糖	500 mL 40 mLを1時間で投与 (40 mL/時)

外傷

セファゾリン (1000mg/瓶)	1瓶 + 生食 10 mL	1.3 mL
破傷風トキソイド	原液	0.5 mL (筋注/皮下注)
テタノブリン IH (250単位/3.4 mL)	原液	3.4 mL
マンニゲン (40 g/200 mL)	原液	20 mL

持続静注薬

カコージン (100 mg/5 mL)	5 mL + 生食 35 mL (計 40 mL)	1 mL/時 (10 μ g/kg/分)
ドプミン (100 mg/5 mL)	5 mL + 生食 35 mL (計 40 mL)	1 mL/時 (10 μ g/kg/分)
アドレナリン (1 mg/1 mL)	1 mL + 生食 39 mL (計 40 mL)	1 mL/時 (0.1 μ g/kg/分)
ノルアドレナリン (1 mg/1 mL)	1 mL + 生食 39 mL (計 40 mL)	1 mL/時 (0.1 μ g/kg/分)
ドルミカム (10 mg/2 mL)	2 mL + 生食 28 mL (計 30 mL)	1 mL/時 (2 mg/kg/日)

4 kg

喘息重積・アナフィラキシー・クローブ

アドレナリン (1 mg/1 mL)

1 mL + 生食 9 mL 0.4 mL 筋注

1 mL + 生食 100 mL 4 mL 静注

2分以上かけて投与

アタラックス P (25 mg/1 mL) 原液 0.1 mL

メチルプレドニゾロン (40 mg/ 瓶)

1 瓶 + 溶解液 1 mL 0.1 mL

ガスター (20 mg/2 mL) 原液 0.2 mL

吸入 アドレナリン (1 mg/1 mL) 原液 0.3 mL + 生食 3 mL

ベネトリン吸入液 (0.5 %) 原液 0.3 mL + 生食 3 mL

プロタノール (1 mg/5 mL) 10A + 水 400 mL 持続吸入
(インスピロン使用)

中毒

腸洗浄

活性炭 50 g + 水 200 mL 16 mL

ラキソベロン 2 滴

ガストログラフィン 4 mL

} 胃管より投与

パム (500 mg/20 mL) 原液 3.2 mL

ナロキソン (0.2 mg/1 mL)

1 mL + 生食 3 mL (計 4 mL) 0.4 mL

アネキセート (0.5 mg/5 mL) 原液 0.4 mL

グルカゴン G ノボ (1 mg/瓶) 1 瓶 + 生食 2 mL 0.4 mL

ブリディオオン (200 mg/2 mL) 原液 0.6 mL

6 kg

挿管 / 麻酔導入

硫酸アトロピン (0.5 mg/1 mL)	原液	0.2 mL
ドルミカム (10 mg/2 mL)	2 mL + 生食 8 mL (計 10 mL)	0.6 mL
フェンタニル (100 µg/2 mL)	原液	0.3 mL
エスラックス (25 mg/2.5 mL)	原液	0.6 mL
挿管チューブ (サイズ)	ID 3.5 mm	カフなし
(固定長)	経口 11 cm / 経鼻 13 cm	
喉頭鏡ブレード	Mil 0 or 1 / (Mac 0)	
骨髄針	15 G	
中心静脈カテーテル	4 Fr トリプル	
膀胱カテーテル	6 Fr	
胃管	8 Fr	30 cm 固定
胸腔ドレーン	14 Fr	

輸液

維持量	24 mL/ 時
急速投与	1 回 120 mL 投与後再評価
輸血	1 回 60 mL 投与後再評価

6 kg

CPR/ 不整脈

胸骨圧迫：人工呼吸	15：2	除細動	24 J
Cardioversion（同期）	1 回目	6 J	
	2 回目以降	12 J	
アドレナリン（1 mg/1 mL）	1 mL + 生食 9 mL（計 10 mL）	0.6 mL	（気管内：原液 0.6 mL）
硫酸マグネシウム （2.46g/20mL）	原液	2.4 mL	20 分以上かけて投与
アデホス L コーワ （10mg/2mL）	2 mL + 生食 8 mL（計 10 mL）	1 回目	0.6 mL
		2 回目以降	1.2 mL
硫酸アトロピン（0.5 mg/1 mL）	原液	0.2 mL	
アンカロン（150 mg/3 mL）	3 mL + 5% ブドウ糖	57 mL	（計 60 mL）
VF / 脈なし VT	6 mL		
脈あり VT	6 mL	15 分で投与	（24mL/ 時）

けいれん

ドルミカム（10 mg/2 mL）	2 mL + 生食 8 mL（計 10 mL）	0.6 mL	（筋注 / 鼻腔内：原液 0.1 mL）
ラボナール（300 mg/12 mL）	原液	0.5 mL	
ノーベルバル（250 mg/ 瓶）	1 瓶 を生食 5 mL で希釈	希釈液 2.4 mL + 生食 17.6 mL	（計 20mL）
		20 分で投与	（60 mL/ 時）
ホストイン（750 mg/10 mL）	1.8 mL + 生食 18.2 mL（計 20 mL）	20 分で投与	（60 mL/ 時）
ダイアップ坐（4 mg）	1 個		

6 kg

電解質異常・低血糖

メイロン注 (8.4%)	原液	6 mL
カルチコール (8.5%)	原液	3 mL
20% ブドウ糖	原液	30 mL
10% 塩化ナトリウム	原液 12 mL + 5% ブドウ糖 24 mL (計 36 mL)	30 分で投与 (72 mL/時)
ケイキサレート (5 g/包) 1 包 + 5% ブドウ糖	20 mL	12 mL (注腸)
GI 療法 ヒューマリン R100	0.2 mL + 10% ブドウ糖	500 mL 60 mL を 1 時間で投与 (60 mL/時)

外傷

セファゾリン (1000 mg/瓶)	1 瓶 + 生食 10 mL	2 mL
破傷風トキソイド	原液	0.5 mL (筋注 / 皮下注)
テタノブリン IH (250 単位 / 3.4 mL)	原液	3.4 mL
マンニゲン (40 g/200 mL)	原液	30 mL

持続静注薬

カコージン (100 mg/5 mL)	5 mL + 生食 45 mL (計 50 mL)	1 mL/時 (5 μ g/kg/分)
ドプミン (100 mg/5 mL)	5 mL + 生食 45 mL (計 50 mL)	1 mL/時 (5 μ g/kg/分)
アドレナリン (1 mg/1 mL)	1 mL + 生食 24 mL (計 25 mL)	1 mL/時 (0.1 μ g/kg/分)
ノルアドレナリン (1 mg/1 mL)	1 mL + 生食 24 mL (計 25 mL)	1 mL/時 (0.1 μ g/kg/分)
ドルミカム (10 mg/2 mL)	2 mL + 生食 18 mL (計 20 mL)	1 mL/時 (2 mg/kg/day)

6 kg

喘息重積・アナフィラキシー・クローブ

アドレナリン (1 mg/1 mL)

1 mL + 生食 9 mL 0.6 mL 筋注
 1 mL + 生食 100 mL 6 mL 静注
 2分以上かけて投与

アタラックス P (25 mg/1 mL) 原液 0.2 mL

メチルプレドニゾロン (40 mg/瓶) 1 瓶 + 溶解液 1 mL 0.2 mL

ガスター (20 mg/2 mL) 原液 0.3 mL

吸入 アドレナリン (1 mg/1 mL) 原液 0.3 mL + 生食 3 mL

ベネトリン吸入液 (0.5 %) 原液 0.3 mL + 生食 3 mL

プロタノール (1 mg/5 mL) 10 A + 水 400 mL 持続吸入
 (インスピロン使用)

中毒

腸洗浄

活性炭 50 g + 水 200 mL 24 mL }
 ラキソベロン 3 滴 } 胃管より投与
 ガストログラフィン 6 mL }

パム (500 mg/20 mL) 原液 4.8 mL

ナロキソン (0.2 mg/1 mL)

1 mL + 生食 3 mL (計 4 mL) 0.6 mL

アネキセート (0.5 mg/5 mL) 原液 0.6 mL

グルカゴン G ノボ (1 mg/瓶) 1 瓶 + 生食 2 mL 0.6 mL

ブリディオン (200 mg/2 mL) 原液 1 mL

8 kg

挿管 / 麻酔導入

硫酸アトロピン (0.5 mg/1 mL)	原液	0.2 mL
ドルミカム (10 mg/2 mL)	2 mL + 生食 8 mL (計 10 mL)	0.8 mL
フェンタニル (100 µg/2 mL)	原液	0.4 mL
エスラックス (25 mg/2.5 mL)	原液	0.8 mL
挿管チューブ (サイズ)	ID 4.0 mm	カフなし
(固定長)	経口 12 cm / 経鼻 15 cm	
喉頭鏡ブレード	Mil 1 / (Mac 1)	
骨髄針	15 G	
中心静脈カテーテル	4 Fr トリプル	
膀胱カテーテル	6 Fr	
胃管	8 Fr	35 cm 固定
胸腔ドレーン	16 Fr	

輸液

維持量	32 mL/時
急速投与	1 回 160 mL 投与後再評価
輸血	1 回 80 mL 投与後再評価

8 kg

CPR/ 不整脈

胸骨圧迫：人工呼吸	15：2	除細動	32 J
Cardioversion（同期）	1 回目	8 J	
	2 回目以降	16 J	
アドレナリン（1 mg/1 mL）	1 mL + 生食 9 mL（計 10 mL）	0.8 mL	
		（気管内：原液 0.8 mL）	
硫酸マグネシウム （2.46 g/20 mL）	原液	3.2 mL	
		20 分以上かけて投与	
アデホス L コーワ （10 mg/2 mL）	2 mL + 生食 8 mL（計 10 mL）		
	1 回目	0.8 mL	
	2 回目以降	1.6 mL	
硫酸アトロピン（0.5 mg/1 mL）	原液	0.2 mL	
アンカロン（150 mg/3 mL）	3 mL + 5% ブドウ糖	57 mL	
		（計 60 mL）	
VF / 脈なし VT	8 mL		
脈あり VT	8 mL	15 分で投与（32 mL/時）	

けいれん

ドルミカム（10 mg/2 mL）	2 mL + 生食 8 mL（計 10 mL）	0.8 mL	
		（筋注 / 鼻腔内：原液 0.1 mL）	
ラボナール（300 mg/12 mL）	原液	0.6 mL	
ノーベルバル（250 mg/瓶）	1 瓶を生食 5 mL で希釈		
	希釈液 3.2 mL + 生食 16.8 mL		
		（計 20 mL）	
		20 分で投与	（60 mL/時）
ホストイン（750 mg/10 mL）	2.4 mL + 生食 17.6 mL（計 20 mL）		
		20 分で投与	（60 mL/時）
ダイアップ坐（6 mg）	1 個		

8 kg

電解質異常・低血糖

メイロン注 (8.4%)	原液	8 mL
カルチコール (8.5%)	原液	4 mL
20% ブドウ糖	原液	40 mL
10% 塩化ナトリウム		
原液 16 mL + 5% ブドウ糖	32 mL (計 48 mL)	
		30 分で投与 (96 mL/時)
ケイキサレート (5 g/包) 1 包 + 5% ブドウ糖	20 mL	
		16 mL (注腸)
GI 療法 ヒューマリン R100	0.2 mL + 10% ブドウ糖	500 mL
		80 mL を 1 時間で投与 (80 mL/時)

外傷

セファゾリン (1000 mg/ 瓶)		
1 瓶 + 生食 10 mL		2.6 mL
破傷風トキソイド	原液	0.5 mL (筋注 / 皮下注)
テタノブリン IH (250 単位 / 3.4 mL)	原液	3.4 mL
マンニゲン (40 g/200 mL)	原液	40 mL

持続静注薬

カコージン (100 mg/5 mL)	5 mL + 生食 35 mL (計 40 mL)	
		1 mL/時 (5 μ g/kg/分)
ドプミン (100 mg/5 mL)	5 mL + 生食 35 mL (計 40 mL)	
		1 mL/時 (5 μ g/kg/分)
アドレナリン (1 mg/1 mL)	1 mL + 生食 19 mL (計 20 mL)	
		1 mL/時 (0.1 μ g/kg/分)
ノルアドレナリン (1 mg/1 mL)	1 mL + 生食 19 mL (計 20 mL)	
		1 mL/時 (0.1 μ g/kg/分)
ドルミカム (10 mg/2 mL)	2 mL + 生食 18 mL (計 20 mL)	
		1 mL/時 (2 mg/kg/day)

8 kg

喘息重積・アナフィラキシー・ク룹

アドレナリン (1 mg/1 mL)

1mL + 生食	9 mL	0.8 mL	筋注
1mL + 生食	100 mL	8 mL	静注

2分以上かけて投与

アタラックスP (25 mg/1 mL) 原液 0.3 mL

メチルプレドニゾロン (40 mg/瓶) 1 瓶 + 溶解液 1 mL 0.2 mL

ガスター (20 mg/2 mL) 原液 0.4 mL

吸入 アドレナリン (1 mg/1 mL) 原液 0.3 mL + 生食 3 mL

ベネトリン吸入液 (0.5 %) 原液 0.3 mL + 生食 3 mL

プロタノール (1 mg/5 mL) 10 A + 水 400 mL 持続吸入
(インスピロン使用)

中毒

腸洗浄

活性炭 50 g + 水 200 mL	32 mL	} 胃管より投与
ラキソベロン	4 滴	
ガストログラフィン	8 mL	

パム (500 mg/20 mL) 原液 6.4 mL

ナロキソン (0.2 mg/1 mL)

1 mL + 生食 3 mL (計 4 mL) 0.8 mL

アネキセート (0.5 mg/5 mL) 原液 0.8 mL

グルカゴンG ノボ (1 mg/瓶) 1 瓶 + 生食 2 mL 0.8 mL

ブリディオ (200 mg/2 mL) 原液 1.3 mL

10 kg

挿管 / 麻酔導入

硫酸アトロピン (0.5 mg/1 mL)	原液	0.2 mL
ドルミカム (10 mg/2 mL)	1 mL + 生食 8 mL (計 10 mL)	1 mL
フェンタニル (100 µg/2 mL)	原液	0.5 mL
エスラックス (25 mg/2.5 mL)	原液	1 mL
挿管チューブ (サイズ)	ID 4.0 mm	カフなし
(固定長)	経口 12 cm / 経鼻 15 cm	
喉頭鏡ブレード	Mil 1 / (Mac 1)	
骨髄針	15 G	
中心静脈カテーテル	5.5 Fr トリプル	
膀胱カテーテル	8 Fr	
胃管	8 Fr	40 cm 固定
胸腔ドレーン	16 Fr	

輸液

維持量	40 mL/時
急速投与	1 回 200 mL 投与後再評価
輸血	1 回 100 mL 投与後再評価

10 kg

CPR/ 不整脈

胸骨圧迫：人工呼吸	15：2	除細動	40 J
Cardioversion（同期）	1 回目	10 J	
	2 回目以降	20 J	
アドレナリン（1 mg/1 mL）	1 mL + 生食 9 mL（計 10 mL） 1 mL （気管内：原液 1 mL）		
硫酸マグネシウム （2.46 g/20 mL）	原液	4 mL	20 分以上かけて投与
アデホス L コーフ （10 mg/2 mL）	2 mL + 生食 8 mL（計 10 mL）		
	1 回目	1 mL	
	2 回目以降	2 mL	
硫酸アトロピン（0.5 mg/1 mL）	原液	0.2 mL	
アンカロン（150 mg/3 mL）	3 mL + 5% ブドウ糖 57 mL （計 60 mL）		
VF / 脈なし VT	10 mL		
脈あり VT	10 mL	15 分で投与	（40 mL/時）

けいれん

ドルミカム（10 mg/2 mL）	2 mL + 生食 8 mL（計 10 mL） 1 mL （筋注 / 鼻腔内：原液 0.2 mL）		
ラボナール（300 mg/12 mL）	原液	0.8 mL	
ノーベルバル（250 mg/瓶）	1 瓶 を生食 5 mL で希釈 希釈液 4 mL + 生食 16 mL （計 20 mL） 20 分で投与（60 mL/時）		
ホストイン（750 mg/10 mL）	3 mL + 生食 17 mL（計 20 mL） 20 分で投与（60 mL/時）		
ダイアップ坐（6 mg）	1 個		

10 kg

電解質異常・低血糖

メイロン注 (8.4%)	原液	10 mL
カルチコール (8.5%)	原液	5 mL
20% ブドウ糖	原液	50 mL
10% 塩化ナトリウム	原液 20 mL + 5% ブドウ糖 40 mL (計 60 mL)	30 分で投与 (120 mL/時)
ケイキサレート (5 g/包) 1 包 + 5% ブドウ糖	20 mL	20 mL (注腸)
GI 療法 ヒューマリン R100	0.2 mL + 10% ブドウ糖	500 mL 100 mL を 1 時間で投与 (100 mL/時)

外傷

セファゾリン (1000 mg/瓶)	1 瓶 + 生食 10 mL	3.3 mL
破傷風トキソイド	原液	0.5 mL (筋注 / 皮下注)
テタノブリン IH (250 単位 / 3.4 mL)	原液	3.4 mL
マンニゲン (40 g/200 mL)	原液	50 mL

持続静注薬

カコージン (100 mg/5 mL)	5 mL + 生食 30 mL (計 35 mL)	1 mL/時 (5 μ g/kg/分)
ドプミン (100 mg/5 mL)	5 mL + 生食 30 mL (計 35 mL)	1 mL/時 (5 μ g/kg/分)
アドレナリン (1 mg/1 mL)	1 mL + 生食 14 mL (計 15 mL)	1 mL/時 (0.1 μ g/kg/分)
ノルアドレナリン (1 mg/1 mL)	1 mL + 生食 14 mL (計 15 mL)	1 mL/時 (0.1 μ g/kg/分)
ドルミカム (10 mg/2 mL)	2 mL + 生食 10 mL (計 12 mL)	1 mL/時 (2 mg/kg/day)

10 kg

喘息重積・アナフィラキシー・クローブ

アドレナリン (1 mg/1 mL)

1 mL + 生食 9 mL 1 mL 筋注
 1 mL + 生食 100 mL 10 mL 静注
 2分以上かけて投与

アタラックス P (25 mg/1 mL) 原液 0.4 mL

メチルプレドニゾロン (40 mg/瓶) 1 瓶 + 溶解液 1 mL 0.3 mL

ガスター (20 mg/2 mL) 原液 0.5 mL

吸入 アドレナリン (1 mg/1 mL) 原液 0.3 mL + 生食 3 mL

ベネトリン吸入液 (0.5 %) 原液 0.3 mL + 生食 3 mL

プロタノール (1 mg/5 mL) 10 A + 水 400 mL 持続吸入
 (インスピロン使用)

中毒

腸洗浄

活性炭 50 g + 水 200 mL 40 mL
 ラキソベロン 5 滴
 ガストログラフィン 10 mL } 胃管より投与

パム (500 mg/20 mL) 原液 8 mL

ナロキソン (0.2 mg/1 mL)

1 mL + 生食 3 mL (計 4 mL) 1 mL

アネキセート (0.5 mg/5 mL) 原液 1 mL

グルカゴン G ノボ (1 mg/瓶) 1 瓶 + 生食 2 mL 1 mL

ブリディオン (200 mg/2 mL) 原液 1.6 mL

12 kg

挿管 / 麻酔導入

硫酸アトロピン (0.5 mg/1 mL)	原液	0.2 mL
ドルミカム (10 mg/2 mL)	2 mL + 生食 8 mL (計 10 mL)	1.2 mL
フェンタニル (100 µg/2 mL)	原液	0.6 mL
エスラックス (25 mg/2.5 mL)	原液	1.2 mL
挿管チューブ (サイズ)	ID 4.5 mm	カフなし
(固定長)	経口 13 cm / 経鼻 16 cm	
喉頭鏡ブレード	Mil 1 or 2 / (Mac 1 or 2)	
骨髄針	15 G	
中心静脈カテーテル	5.5 Fr トリプル	
膀胱カテーテル	8 Fr	
胃管	10 Fr	40 cm 固定
胸腔ドレーン	18 Fr	

輸液

維持量	45 mL/時
急速投与	1 回 240 mL 投与後再評価
輸血	1 回 120 mL 投与後再評価

12 kg

CPR/ 不整脈

胸骨圧迫：人工呼吸	15：2	除細動	48 J
Cardioversion（同期）	1 回目	12 J	
	2 回目以降	24 J	
アドレナリン（1 mg/1 mL）	1 mL + 生食 9 mL（計 10 mL）	1.2 mL	
		（気管内：原液 1 mL）	
硫酸マグネシウム （2.46 g/20 mL）	原液	4.8 mL	
		20 分以上かけて投与	
アデホス L コーワ （10 mg/2 mL）	2 mL + 生食 8 mL（計 10 mL）	1 回目	1.2 mL
		2 回目以降	2.4 mL
硫酸アトロピン（0.5 mg/1 mL）	原液	0.2 mL	
アンカロン（150 mg/3 mL）	3 mL + 5% ブドウ糖	57 mL	
		（計 60 mL）	
VF / 脈なし VT	12 mL		
脈あり VT	12 mL	15 分で投与	（48 mL/時）

けいれん

ドルミカム（10 mg/2 mL）	2 mL + 生食 8 mL（計 10 mL）	1.2 mL	
		（筋注 / 鼻腔内：原液 0.2 mL）	
ラボナール（300 mg/12 mL）	原液	1 mL	
ノーベルバール（250 mg/瓶）	1 瓶 を生食 5 mL で希釈	希釈液 4.8 mL + 生食 15.2 mL	
		（計 20 mL）	
		20 分で投与	（60 mL/時）
ホストイン（750 mg/10 mL）	3.6 mL + 生食 16.4 mL（計 20 mL）	20 分で投与	（60 mL/時）
ダイアップ坐（6 mg）	1 個		

12 kg

電解質異常・低血糖

メイロン注 (8.4%)	原液	12 mL
カルチコール (8.5%)	原液	6 mL
20% ブドウ糖	原液	60 mL
10% 塩化ナトリウム	原液 24 mL + 5% ブドウ糖 48 mL (計 72 mL)	30 分で投与 (144 mL/時)
ケイキサレート (5 g/包) 2 包 + 5% ブドウ糖	40 mL	24 mL (注腸)
GI 療法 ヒューマリン R100	0.2 mL + 10% ブドウ糖	500 mL 120 mL を 1 時間で投与 (120 mL/時)

外傷

セファゾリン (1000 mg/瓶)	1 瓶 + 生食 10 mL	4 mL
破傷風トキソイド	原液	0.5 mL (筋注 / 皮下注)
テタノブリン IH (250 単位 / 3.4 mL)	原液	3.4 mL
マンニゲン (40 g/200 mL)	原液	60 mL

持続静注薬

カコージン (100 mg/5 mL)	5 mL + 生食 20 mL (計 25 mL)	1 mL/時 (5 μ g/kg/分)
ドプミン (100 mg/5 mL)	5 mL + 生食 20 mL (計 25 mL)	1 mL/時 (5 μ g/kg/分)
アドレナリン (1 mg/1 mL)	1 mL + 生食 13 mL (計 14 mL)	1 mL/時 (0.1 μ g/kg/分)
ノルアドレナリン (1 mg/1 mL)	1 mL + 生食 13 mL (計 14 mL)	1 mL/時 (0.1 μ g/kg/分)
ドルミカム (10 mg/2 mL)	2 mL + 生食 8 mL (計 10 mL)	1 mL/時 (2 mg/kg/day)

12 kg

喘息重積・アナフィラキシー・クローブ

アドレナリン (1 mg/1 mL)

原液	0.1 mL	筋注
1 mL + 生食 100 mL	12 mL	静注

2分以上かけて投与

アタラックス P (25 mg/1 mL)	原液	0.4 mL
-----------------------	----	--------

メチルプレドニゾロン (40 mg/瓶)	1 瓶 + 溶解液 1 mL	0.3 mL
----------------------	----------------	--------

ガスター (20 mg/2 mL)	原液	0.6 mL
-------------------	----	--------

吸入 アドレナリン (1 mg/1 mL)	原液 0.3 mL + 生食 3 mL
-----------------------	---------------------

ベネトリン吸入液 (0.5 %)	原液 0.3 mL + 生食 3 mL
------------------	---------------------

プロタノール (1 mg/5 mL)	10 A + 水 400 mL	持続吸入 (インスピロン使用)
--------------------	-----------------	--------------------

中毒

腸洗浄

活性炭 50 g + 水 200 mL	48 mL	} 胃管より投与
ラキソベロン	6 滴	
ガストログラフィン	12 mL	

パム (500 mg/20 mL)	原液	9.6 mL
-------------------	----	--------

ナロキソン (0.2 mg/1 mL)

1 mL + 生食 3 mL (計 4 mL)	1.2 mL
-------------------------	--------

アネキセート (0.5 mg/5 mL)	原液	1.2 mL
----------------------	----	--------

グルカゴン G ノボ (1 mg/瓶)	1 瓶 + 生食 2 mL	1.2 mL
---------------------	---------------	--------

ブリディオン (200 mg/2 mL)	原液	1.9 mL
----------------------	----	--------

15 kg

挿管 / 麻酔導入

硫酸アトロピン (0.5 mg/1 mL)	原液	0.3 mL
ドルミカム (10 mg/2 mL)	2 mL + 生食 8 mL (計 10 mL)	1.5 mL
フェンタニル (100 μ g/2 mL)	原液	0.6 mL
エスラックス (25 mg/2.5 mL)	原液	1.5 mL
挿管チューブ (サイズ) (固定長)	ID 5.0 mm カフなし ID 4.5 mm カフあり 経口 14 cm / 経鼻 17 cm	
喉頭鏡ブレード	Mil 2 / (Mac 2)	
骨髄針	15 G	
中心静脈カテーテル	5.5 Fr トリプル	
膀胱カテーテル	10 Fr	
胃管	10 Fr	40 cm 固定
胸腔ドレーン	20 Fr	

輸液

維持量	50 mL/時
急速投与	1 回 300 mL 投与後再評価
輸血	1 回 150 mL 投与後再評価

15 kg

CPR/ 不整脈

胸骨圧迫：人工呼吸	15：2	除細動	60 J
Cardioversion（同期）	1 回目	15 J	
	2 回目以降	30 J	
アドレナリン（1 mg/1 mL）	1 mL + 生食 9 mL（計 10 mL） 1.5 mL （気管内：原液 1 mL）		
硫酸マグネシウム （2.46 g/20 mL）	原液	6 mL	20 分以上かけて投与
アデホス L コーフ （10 mg/2 mL）	2 mL + 生食 8 mL（計 10 mL）		
	1 回目	1.5 mL	
	2 回目以降	3 mL	
硫酸アトロピン（0.5 mg/1 mL）	原液	0.3 mL	
アンカロン（150 mg/3 mL）	3 mL + 5% ブドウ糖 57 mL （計 60 mL）		
VF / 脈なし VT	15 mL		
脈あり VT	15 mL	15 分で投与	（60 mL/時）

けいれん

ドルミカム（10 mg/2 mL）	2 mL + 生食 8 mL（計 10 mL） 1.5 mL （筋注 / 鼻腔内：原液 0.3 mL）		
ラボナール（300 mg/12 mL）	原液	1.2 mL	
ノーベルバル（250 mg/瓶）	1 瓶 を生食 5 mL で希釈 希釈液 6 mL + 生食 14 mL （計 20 mL） 20 分で投与（60 mL/時）		
ホストイン（750 mg/10 mL）	4.5 mL + 生食 15.5 mL（計 20 mL） 20 分で投与（60 mL/時）		
ダイアップ坐（10 mg）	1 個		

15 kg

電解質異常・低血糖

メイロン注 (8.4%)	原液	15 mL
カルチコール (8.5%)	原液	7 mL
20% ブドウ糖	原液	75 mL
10% 塩化ナトリウム 原液 30 mL + 5% ブドウ糖 60 mL (計 90 mL)		30 分で投与 (180 mL/時)
ケイキサレート (5 g/包) 2 包 + 5% ブドウ糖 40 mL		30 mL (注腸)
GI 療法 ヒューマリン R100 0.2 mL + 10% ブドウ糖 500 mL		150 mL を 1 時間で投与 (150 mL/時)

外傷

セファゾリン (1000 mg/瓶) 1 瓶 + 生食 10 mL		5 mL
破傷風トキソイド	原液	0.5 mL (筋注 / 皮下注)
テタノブリン IH (250 単位 / 3.4 mL)	原液	3.4 mL
マンニゲン (40 g / 200 mL)	原液	75 mL

持続静注薬

カコージン (100 mg / 5 mL)	5 mL + 生食 17 mL (計 22 mL)	1 mL / 時 (5 μ g / kg / 分)
ドプミン (100 mg / 5 mL)	5 mL + 生食 17 mL (計 22 mL)	1 mL / 時 (5 μ g / kg / 分)
アドレナリン (1 mg / 1 mL)	2 mL + 生食 18 mL (計 20 mL)	1 mL / 時 (0.1 μ g / kg / 分)
ノルアドレナリン (1 mg / 1 mL)	2 mL + 生食 18 mL (計 20 mL)	1 mL / 時 (0.1 μ g / kg / 分)
ドルミカム (10 mg / 2 mL)	4 mL + 生食 12 mL (計 16 mL)	1 mL / 時 (2 mg / kg / day)

15 kg

喘息重積・アナフィラキシー・クローブ

アドレナリン (1 mg/1 mL)		
	原液	0.1 mL 筋注
	1mL + 生食 100 mL	15 mL 静注
2分以上かけて投与		
アタラックス P (25 mg/1 mL)	原液	0.5 mL
メチルプレドニゾロン (40 mg/瓶)	1 瓶 + 溶解液 1 mL	0.4 mL
ガスター (20 mg/2 mL)	原液	0.7 mL
吸入	アドレナリン (1 mg/1 mL)	原液 0.3 mL + 生食 3 mL
	ベネトリン吸入液 (0.5 %)	原液 0.3 mL + 生食 3 mL
	プロタノール (1 mg/5 mL)	10 A + 水 400 mL 持続吸入 (インスピロン使用)

中毒

腸洗浄		
活性炭 50 g + 水 200 mL	60 mL	} 胃管より投与
ラキソベロン	7 滴	
ガストログラフィン	15 mL	
パム (500 mg/20 mL)	原液	12 mL
ナロキソン (0.2 mg/1 mL)	1 mL + 生食 3 mL (計 4 mL)	1.5 mL
アネキセート (0.5 mg/5 mL)	原液	1.5 mL
グルカゴン G ノボ (1 mg/瓶)	1 瓶 + 生食 2 mL	1.5 mL
ブリディオオン (200 mg/2 mL)	原液	2.4 mL

20 kg

挿管 / 麻酔導入

硫酸アトロピン (0.5 mg/1 mL)	原液	0.4 mL
ドルミカム (10 mg/2 mL)	2 mL + 生食 8 mL (計 10 mL)	2 mL
フェンタニル (100 μ g/2 mL)	原液	1 mL
エスラックス (25 mg/2.5 mL)	原液	2 mL
挿管チューブ (サイズ)	ID 5.5 mm	カフなし
	ID 5.0 mm	カフあり
(固定長)	経口 16 cm / 経鼻 19 cm	
喉頭鏡ブレード	Mil 2 / Mac 2	
骨髄針	15 G	
中心静脈カテーテル	5.5 Fr トリプル	
膀胱カテーテル	10 Fr	
胃管	10 Fr	42 cm 固定
胸腔ドレーン	22 Fr	

輸液

維持量	60 mL/時
急速投与	1 回 400 mL 投与後再評価
輸血	1 回 200 mL 投与後再評価

20 kg

CPR/ 不整脈

胸骨圧迫：人工呼吸	15：2	除細動	80 J
Cardioversion（同期）	1 回目	20 J	
	2 回目以降	40 J	
アドレナリン（1 mg/1 mL）	1 mL + 生食 9 mL（計 10 mL） 2 mL （気管内：原液 1 mL）		
硫酸マグネシウム （2.46 g/20 mL）	原液	8 mL	20 分以上かけて投与
アデホス L コーフ （10 mg/2 mL）	2 mL + 生食 8 mL（計 10 mL）		
	1 回目	2 mL	
	2 回目以降	4 mL	
硫酸アトロピン（0.5 mg/1 mL）	原液	0.4 mL	
アンカロン（150 mg/3 mL）	3 mL + 5% ブドウ糖 57 mL （計 60 mL）		
VF / 脈なし VT	20 mL		
脈あり VT	20 mL	15 分で投与	（80 mL/時）

けいれん

ドルミカム（10 mg/2 mL）	2 mL + 生食 8 mL（計 10 mL） 2 mL （筋注 / 鼻腔内：原液 0.4 mL）		
ラボナール（300 mg/12 mL）	原液	1.6 mL	
ノーベルバル（250 mg/瓶）	2 瓶を生食 10 mL で希釈 希釈液 8 mL + 生食 12 mL （計 20 mL） 20 分で投与（60 mL/時）		
ホストイン（750 mg/10 mL）	6 mL + 生食 14 mL（計 20 mL） 20 分で投与（60 mL/時）		
ダイアップ坐（10 mg）	1 個		

20 kg

電解質異常・低血糖

メイロン注 (8.4%)	原液	20 mL
カルチコール (8.5%)	原液	10 mL
20% ブドウ糖	原液	100 mL
10% 塩化ナトリウム	原液 38 mL + 5% ブドウ糖 76 mL (計 114 mL)	
	30 分で投与 (228 mL/時)	
ケイキサレート (5 g/包) 2 包 + 5% ブドウ糖	40 mL	
	40 mL (注腸)	
GI 療法 ヒューマリン R100	0.2 mL + 10% ブドウ糖	500 mL
	200 mL を 1 時間で投与 (200 mL/時)	

外傷

セファゾリン (1000 mg/瓶)	1 瓶 + 生食 10 mL	
	6.6 mL	
破傷風トキソイド	原液	0.5 mL (筋注 / 皮下注)
テタノブリン IH (250 単位 / 3.4 mL)	原液	3.4 mL
マンニゲン (40 g/200 mL)	原液	100 mL

持続静注薬

カコージン (100 mg/5 mL)	5 mL + 生食 13 mL (計 18 mL)
	1 mL/時 (5 μ g/kg/分)
ドプミン (100 mg/5 mL)	5 mL + 生食 13 mL (計 18 mL)
	1 mL/時 (5 μ g/kg/分)
アドレナリン (1 mg/1 mL)	2 mL + 生食 14 mL (計 16 mL)
	1 mL/時 (0.1 μ g/kg/分)
ノルアドレナリン (1 mg/1 mL)	2 mL + 生食 14 mL (計 16 mL)
	1 mL/時 (0.1 μ g/kg/分)
ドルミカム (10 mg/2 mL)	4 mL + 生食 8 mL (計 12 mL)
	1 mL/時 (2 mg/kg/day)

20 kg

喘息重積・アナフィラキシー・クローブ

アドレナリン (1 mg/1 mL)		
	原液	0.2 mL 筋注
	1 mL + 生食 100 mL	20 mL 静注
2分以上かけて投与		
アタラックス P (25 mg/1 mL)	原液	0.6 mL
メチルプレドニゾロン (40 mg/瓶)	1 瓶 + 溶解液 1 mL	0.5 mL
ガスター (20 mg/2 mL)	原液	1 mL
吸入	アドレナリン (1 mg/1 mL)	原液 0.3 mL + 生食 3 mL
	ベネトリン吸入液 (0.5 %)	原液 0.3 mL + 生食 3 mL
	プロタノール (1 mg/5 mL)	10 A + 水 400 mL 持続吸入 (インスピロン使用)

中毒

腸洗浄		
活性炭 50 g + 水 200 mL	80 mL	} 胃管より投与
ラキソベロン	10 滴	
ガストログラフィン	20 mL	
パム (500 mg/20 mL)	原液	16 mL
ナロキソン (0.2 mg/1 mL)		
	1 mL + 生食 3 mL (計 4 mL)	2 mL
アネキセート (0.5 mg/5 mL)	原液	2 mL
グルカゴン G ノボ (1 mg/瓶)	1 瓶 + 生食 2 mL	2 mL
ブリディオン (200 mg/2 mL)	原液	3.2 mL

25 kg

挿管 / 麻酔導入

硫酸アトロピン (0.5 mg/1 mL)	原液	0.5 mL
ドルミカム (10 mg/2 mL)	2 mL + 生食 8 mL (計 10 mL)	2.5 mL
フェンタニル (100 µg/2 mL)	原液	1.2 mL
エスラックス (25 mg/2.5 mL)	原液	2.5 mL
挿管チューブ (サイズ)	ID 6.0 mm カフなし	
	ID 5.5 mm カフあり	
(固定長)	経口 18 cm / 経鼻 21 cm	
喉頭鏡ブレード	Mac 2 or 3 / Mil 2	
骨髄針	15 G	
中心静脈カテーテル	7 Fr トリプル	
膀胱カテーテル	12 Fr	
胃管	12 Fr	45 cm 固定
胸腔ドレーン	24 Fr	

輸液

維持量	65 mL/時
急速投与	1 回 500 mL 投与後再評価
輸血	1 回 250 mL 投与後再評価

25 kg

CPR/ 不整脈

胸骨圧迫：人工呼吸	15：2	除細動	100 J
Cardioversion（同期）	1 回目	25 J	
	2 回目以降	50 J	
アドレナリン（1 mg/1 mL）	1 mL + 生食 9 mL（計 10 mL）	2.5 mL	（気管内：原液 1 mL）
硫酸マグネシウム （2.46 g/20 mL）	原液	10 mL	20 分以上かけて投与
アデホス L コーワ （10 mg/2 mL）	2 mL + 生食 8 mL（計 10 mL）	1 回目	2.5 mL
		2 回目以降	5.0 mL
硫酸アトロピン（0.5 mg/1 mL）	原液	0.5 mL	
アンカロン（150 mg/3 mL）	3 mL + 5% ブドウ糖	57 mL	（計 60 mL）
VF / 脈なし VT	25 mL		
脈あり VT	25 mL	15 分で投与	（100 mL/時）

けいれん

ドルミカム（10 mg/2 mL）	2 mL + 生食 8 mL（計 10 mL）	原液	2.5 mL	（筋注 / 鼻腔内：原液 0.5 mL）
ラボナール（300 mg/12 mL）	原液	2 mL		
ノーベルバル（250 mg/瓶）	2 瓶 を生食 10 mL で希釈	希釈液 10 mL + 生食 10 mL	（計 20 mL）	20 分で投与（60 mL/時）
ホストイン（750 mg/10 mL）	7.5 mL + 生食 12.5 mL（計 20 mL）			20 分で投与（60 mL/時）
ダイアップ坐（6 mg）	2 個			

25 kg

電解質異常・低血糖

メイロン注 (8.4%)	原液	25 mL
カルチコール (8.5%)	原液	12 mL
20% ブドウ糖	原液	125 mL
10% 塩化ナトリウム	原液 48 mL + 5% ブドウ糖 96 mL (計 144 mL)	
	30 分で投与 (288 mL/時)	
ケイキサレート (5 g/包) 3 包 + 5% ブドウ糖	60 mL	
	50 mL (注腸)	
GI 療法 ヒューマリン R100	0.2 mL + 10% ブドウ糖	500 mL
	250 mL を 1 時間で投与 (250 mL/時)	

外傷

セファゾリン (1000 mg/瓶)	1 瓶 + 生食 10 mL	
	8.3 mL	
破傷風トキソイド	原液	0.5 mL (筋注 / 皮下注)
テタノブリン IH (250 単位 / 3.4 mL)	原液	3.4 mL
マンニゲン (40 g/200 mL)	原液	125 mL

持続静注薬

カコージン (100 mg/5 mL)	10 mL + 生食 18 mL (計 28 mL)
	1 mL/時 (5 μ g/kg/分)
ドプミン (100 mg/5 mL)	10 mL + 生食 18 mL (計 28 mL)
	1 mL/時 (5 μ g/kg/分)
アドレナリン (1 mg/1 mL)	2 mL + 生食 10 mL (計 12 mL)
	1 mL/時 (0.1 μ g/kg/分)
ノルアドレナリン (1 mg/1 mL)	2 mL + 生食 10 mL (計 12 mL)
	1 mL/時 (0.1 μ g/kg/分)
ドルミカム (10 mg/2 mL)	4 mL + 生食 6 mL (計 10 mL)
	1 mL/時 (2 mg/kg/day)

25 kg

喘息重積・アナフィラキシー・クローブ

アドレナリン (1 mg/1 mL)

原液	0.3 mL	筋注
1 mL + 生食 100 mL	25 mL	静注

2分以上かけて投与

アタラックス P (25 mg/1 mL)	原液	0.8 mL
-----------------------	----	--------

メチルプレドニゾロン (40 mg/瓶)	1 瓶 + 溶解液 1 mL	0.6 mL
----------------------	----------------	--------

ガスター (20 mg/2 mL)	原液	1.2 mL
-------------------	----	--------

吸入 アドレナリン (1 mg/1 mL)	原液 0.3 mL + 生食 3 mL
-----------------------	---------------------

ベネトリン吸入液 (0.5 %)	原液 0.3 mL + 生食 3 mL
------------------	---------------------

プロタノール (1 mg/5 mL)	10 A + 水 400 mL	持続吸入 (インスピロン使用)
--------------------	-----------------	--------------------

中毒

腸洗浄

活性炭 50 g + 水 200 mL	100 mL	} 胃管より投与
ラキソベロン	12 滴	
ガストログラフィン	25 mL	

パム (500 mg/20 mL)	原液	20 mL
-------------------	----	-------

ナロキソン (0.2 mg/1 mL)

1 mL + 生食 3 mL (計 4 mL)	2.5 mL
-------------------------	--------

アネキセート (0.5 mg/5 mL)	原液	2.5 mL
----------------------	----	--------

グルカゴン G ノボ (1 mg/瓶)	2 瓶 + 生食 4 mL	2.5 mL
---------------------	---------------	--------

ブリディオン (200 mg/2 mL)	原液	4 mL
----------------------	----	------

30 kg

挿管 / 麻酔導入

硫酸アトロピン (0.5 mg/1 mL)	原液	0.6 mL
ドルミカム (10 mg/2 mL)	2 mL + 生食	8 mL (計 10 mL) 3 mL
フェンタニル (100 μ g/2 mL)	原液	1.5 mL
エスラックス (25 mg/2.5 mL)	原液	3 mL
挿管チューブ (サイズ)	ID 6.5 mm	カフなし
	ID 6.0 mm	カフあり
(固定長)	経口 19 cm / 経鼻 22 cm	
喉頭鏡ブレード	Mac 3	
骨髄針	15 G	
中心静脈カテーテル	7 Fr トリプル	
膀胱カテーテル	12 Fr	
胃管	14 Fr	50 cm 固定
胸腔ドレーン	24 Fr	

輸液

維持量	70 mL/時
急速投与	1 回 600 mL 投与後再評価
輸血	1 回 300 mL 投与後再評価

30 kg

CPR/ 不整脈

胸骨圧迫：人工呼吸	15：2	除細動	120 J
Cardioversion (同期)	1 回目	30 J	
	2 回目以降	60 J	
アドレナリン (1 mg/1 mL)	1 mL + 生食 9 mL (計 10 mL) 3 mL (気管内：原液 1 mL)		
硫酸マグネシウム (2.46 g/20 mL)	原液	12 mL	20 分以上かけて投与
アデホス L コーフ (10 mg/2 mL)	2 mL + 生食 8 mL (計 10 mL)		
	1 回目	3 mL	
	2 回目以降	6 mL	
硫酸アトロピン (0.5 mg/1 mL)	原液	0.6 mL	
アンカロン (150 mg/3 mL)	3 mL + 5% ブドウ糖 57 mL (計 60 mL)		
VF / 脈なし VT	30 mL		
脈あり VT	30 mL	15 分で投与	(120 mL/時)

けいれん

ドルミカム (10 mg/2 mL)	2 mL + 生食 8 mL (計 10 mL) 3 mL (筋注 / 鼻腔内：原液 0.6 mL)		
ラボナール (300 mg/12 mL)	原液	2.4 mL	
ノーベルバル (250 mg/瓶)	3 瓶を生食 15 mL で希釈 希釈液 12 mL + 生食 8 mL (計 20 mL) 20 分で投与 (60 mL/時)		
ホストイン (750 mg/10 mL)	9 mL + 生食 11 mL (計 20 mL) 20 分で投与 (60 mL/時)		
ダイアップ坐 (10 mg)	2 個		

30 kg

電解質異常・低血糖

メイロン注 (8.4%)	原液	30 mL
カルチコール (8.5%)	原液	15 mL
20% ブドウ糖	原液	150 mL
10% 塩化ナトリウム	原液 60 mL + 5% ブドウ糖 120 mL (計 180 mL) 30 分以上かけて投与 (300 mL/時)	
ケイキサレート (5 g/包) 3 包 + 5% ブドウ糖	60 mL	60 mL (注腸)
GI 療法 ヒューマリン R100	0.2 mL + 10% ブドウ糖	500 mL 300 mL を 1 時間で投与 (300 mL/時)

外傷

セファゾリン (1000 mg/瓶) 1 瓶 + 生食 10 mL		10 mL
破傷風トキソイド	原液	0.5 mL (筋注 / 皮下注)
テタノブリン IH (250 単位 / 3.4 mL)	原液	3.4 mL
マンニゲン (40 g/200 mL)	原液	150 mL

持続静注薬

カコージン (100 mg/5 mL)	10 mL + 生食 12 mL (計 22 mL) 1 mL/時 (5 μ g/kg/分)
ドプミン (100 mg/5 mL)	10 mL + 生食 12 mL (計 22 mL) 1 mL/時 (5 μ g/kg/分)
アドレナリン (1 mg/1 mL)	2 mL + 生食 8 mL (計 10 mL) 1 mL/時 (0.1 μ g/kg/分)
ノルアドレナリン (1 mg/1 mL)	2 mL + 生食 8 mL (計 10 mL) 1 mL/時 (0.1 μ g/kg/分)
ドルミカム (10 mg/2 mL)	6 mL + 生食 6 mL (計 12 mL) 1 mL/時 (2 mg/kg/day)

30 kg

喘息重積・アナフィラキシー・ク룹

アドレナリン (1 mg/1 mL)

原液	0.3 mL	筋注
1 mL + 生食 100 mL	30 mL	静注

2分以上かけて投与

アタラックス P (25 mg/1 mL)	原液	1 mL
-----------------------	----	------

メチルプレドニゾロン (40 mg/瓶)	1 瓶 + 溶解液 1 mL	0.8 mL
----------------------	----------------	--------

ガスター (20 mg/2 mL)	原液	1.5 mL
-------------------	----	--------

吸入 アドレナリン (1 mg/1 mL)	原液 0.3 mL + 生食 3 mL
-----------------------	---------------------

ベネトリン吸入液 (0.5 %)	原液 0.3 mL + 生食 3 mL
------------------	---------------------

プロタノール (1 mg/5 mL)	10 A + 水 400 mL	持続吸入 (インスピロン使用)
--------------------	-----------------	--------------------

中毒

腸洗浄

活性炭 50 g + 水 200 mL	120 mL	} 胃管より投与
ラキソベロン	15 滴	
ガストログラフィン	30 mL	

パム (500 mg/20 mL)	原液	24 mL
-------------------	----	-------

ナロキソン (0.2 mg/1 mL)

1 mL + 生食 3 mL (計 4 mL)	3 mL
-------------------------	------

アネキセート (0.5 mg/5 mL)	原液	3 mL
----------------------	----	------

グルカゴン G ノボ (1 mg/瓶)	2 瓶 + 生食 4 mL	3 mL
---------------------	---------------	------

ブリディオン (200 mg/2 mL)	原液	4.8 mL
----------------------	----	--------