

## 正誤表

Visual 栄養学テキスト『臨床栄養学 II 各論』（初版第2刷）の以下の個所に、誤りがありました。謹んでお詫び申し上げますとともに、下記のように訂正いたします。

(2019.9.11)

p.93 ②成人における血圧値の分類（診察室血圧，mmHg）

誤) 正常高値血圧 収縮期血圧 120-129 かつ/または 拡張期血圧 <80

正) 正常高値血圧 収縮期血圧 120-129 かつ 拡張期血圧 <80

### 誤

② 成人における血圧値の分類（診察室血圧，mmHg）

| 分 類         | 収縮期血圧   |        | 拡張期血圧   |
|-------------|---------|--------|---------|
| 正常血圧        | <120    | かつ     | <80     |
| 正常高値血圧      | 120-129 | かつ/または | <80     |
| 高値血圧        | 130-139 | かつ/または | 80-89   |
| I度高血圧       | 140-159 | かつ/または | 90-99   |
| II度高血圧      | 160-179 | かつ/または | 100-109 |
| III度高血圧     | ≥180    | かつ/または | ≥110    |
| (孤立性)収縮期高血圧 | ≥140    | かつ     | <90     |

(日本高血圧学会高血圧治療ガイドライン作成委員会編，高血圧治療ガイドライン2019，ライフサイエンス出版；2019，p.18より)

### 正

② 成人における血圧値の分類（診察室血圧，mmHg）

| 分 類         | 収縮期血圧   |        | 拡張期血圧   |
|-------------|---------|--------|---------|
| 正常血圧        | <120    | かつ     | <80     |
| 正常高値血圧      | 120-129 | かつ     | <80     |
| 高値血圧        | 130-139 | かつ/または | 80-89   |
| I度高血圧       | 140-159 | かつ/または | 90-99   |
| II度高血圧      | 160-179 | かつ/または | 100-109 |
| III度高血圧     | ≥180    | かつ/または | ≥110    |
| (孤立性)収縮期高血圧 | ≥140    | かつ     | <90     |

(日本高血圧学会高血圧治療ガイドライン作成委員会編，高血圧治療ガイドライン2019，ライフサイエンス出版；2019，p.18より)

【追加修正（2024.11.8）】

p.21：下から5行目

更新後：脂肪細胞の量的異常あるいは質的異常によるものに大別される。

更新前：脂肪細胞の量的異常あるいは質的異常によるものに大別される②。